

نماذج عن الأسئلة الامتحانية للامتحان التقويمي (الوطني) - اختصاص طب الأسنان

1- من أسباب انكسار السن أثناء القلع:

- (a) التصاق السن المجاور
- (b) تطبيق قوة زائدة على السن
- (c) حدوث ربو (Allergic Asthma) تحسسي لدى المريض أثناء القلع.
- (d) وجود آفة ذروية (Periapical Lesion) تحت السن المقلوع.

2- أفضل وسيلة لمكافحة الإلتان:

- (a) استخدام التغطية بالصادات (Antibiotics)
- (b) استخدام ضمادات الصاد الحيوي الموضعية
- (c) خياطة الجرح بعد القلع
- (d) إتباع أسس العقامة والطهارة قبل و أثناء وبعد العمل.

3- أكثر ما يحدث الإلتان (Infection) كاختلاط بعد القلع:

- (a) في المنطقة الأمامية في الفك السفلي
- (b) في المنطقة الخلفية من الفك السفلي
- (c) عند عدم التغطية بالصادات
- (d) في القلوع الصعبة المترافقة بالتفريغ العظمي.

4- من صفات الألجينات (alginates):

- (a) مادة طابعة ذات دقة ممتازة.
- (b) يمكن صب طبعة الألجينات بالجبس (plaster) خلال 24 ساعة.
- (c) يمكن صب الطبعة بالجبس أكثر من مرة.
- (d) مادة رخيصة وسهلة التطبيق.

5- أفضل مادة لأخذ طبعة التعويضات فوق الزرعات هي:

- (a) الألجينات.
- (b) السيليكون المطاطي.
- (c) البولي إيثر.
- (d) متعدد الكبريت (poly sulphate).

6- يتم شطب (beveling) حذبة الدعم (support cusp) في تحضير الأسنان بهدف:

- (a) تأمين سماكة كافية لمادة التعويض.
- (b) توجيه قوة العض باتجاه المحور الطولي للسن.
- (c) منع تركّز قوة العض عند ذروة الحذبة.
- (d) تأمين الناحية التجميلية وخصوصاً في الأسنان السفلية.

7- يتميز اللسان الجغرافي بغياب متكرر لواحدة من الحليمات التالية:

- (a) Fungiform
- (b) Foliate
- (c) Filliform
- (d) Circumvallate

8- تشاهد علامة نيكلوسكي في:

- (a) الفقاع
- (b) الحزاز المنبسط
- (c) الحمامى متعددة الأشكال
- (d) الساركويد

9- إن الحدود الطبيعية للحركة الجانبية للفك السفلي تتراوح بين

- (a) 5-8 ملم
- (b) 8-12 ملم
- (c) 10-20 ملم
- (d) 15-20 ملم

10- تعتمد المعالجة الإسعافية لشلل بل أساساً على استخدام واحد من الأدوية التالية وبجرعة كبيرة:

- (a) Acetaminophen
- (b) Cortisone
- (c) Acyclovir
- (d) Cefaclor

11- من مميزات أقماغ الكوتابركا كل ما يلي (معداً):

- (a) تحوي أوكسيد الزنك.
- (b) تلتصق بالعاج.
- (c) تتقلص عند تبردها.
- (d) قابلة للانضغاط

12- المصطلح الأجنبي للمكثف العمودي:

- (a) Vertical spreader
- (b) Vertical carrier
- (c) Plugger
- (d) Compactor

13- راجعك مريض لديه التهاب لب حاد غير ردود بشكل إسعافي وليس لديك وقت كاف، ماذا تفعل:

- (a) وصف صادات حيوية (Antibiotics).
- (b) وصف مسكن ألم قوي الفاعلية .
- (c) فتح الحجرة اللبية وإزالة اللب التاجي ووضع قطنة وحشوة مؤقتة.
- (d) فتح ثقب بالسن نافذ إلى اللب ووضع قطنة مبللة بمادة دوائية مضادة للاحتقان وحشوة مؤقتة

14- أي من الحالات التالية تعد الأكثر أذية للحليمة اللثوية السنية gingival papilla عند تطبيق

الحاجز المطاطي (Rubber dam):

- (a) جعل الثقوب صغيرة جدا.
- (b) جعل الثقوب متباعدة جدا.
- (c) جعل الثقوب متقاربة جدا.
- (d) الفشل في تزليق Lubricant الحاجز المطاطي قبل عملية التطبيق.

15- يعد تقدم النخر ضمن العاج أبطئ عند الأشخاص المتقدمين بالعمر مقارنة مع صغير السن بسبب:

- (a) تغير PH اللعاب مع تقدم العمر.
- (b) زيادة المحتوى العضوي للعاج ضمن القنيوي intertubular dentin.
- (c) حدوث تصلب معمم Sclerosis في الألفية العاجية مع تقدم العمر.
- (d) نقص استخدام السكر عند المرضى المتقدمين بالعمر.

16- التهاب اللثة التموطي التقرحي الحاد Acute Narcotizing Ulcerative Gingivitis

- (a) عقايل على اللثة
- (b) الغشاء الكاذب يمكن إزالته جراحيا
- (c) سببه جرثومي
- (d) سببه فيروسي

17- تصنيف الطعوم العظمية bone grafts حسب مصدرها

- (a) الطعوم العظمية الأجنبية Xenogenic Bone Grafts. تحتوي على عوامل النمو
- (b) الطعوم غير العظمية Non Bone Grafts تؤخذ من فرد من فصيلة مختلفة
- (c) الطعوم العظمية المتغايرة Allogenic Bone Grafts تؤخذ من فرد من الفصيلة نفسها.
- (d) الطعوم المركبة Composite Grafts تؤخذ من فصيلة نفسها

18- الفائدة من تعليب الطبعة النهائية للدرد الكامل :

- (a) الحفاظ على حواف الطبعة
- (b) الحفاظ على حواف الطابع
- (c) الحفاظ على حواف المثال النهائي
- (d) الحفاظ على حواف المثال الأولي

19- تستطب الصفيحة اللسانية بدلاً من القوس اللسانية كوصلة كبرى للجهاز السني الجزئي إذا كانت:

- (a) المسافة بين حافة اللثة الحرة و قاع الفم التشريحي 10 مم
- (b) هناك ميلان شديد للضواحك السفلية لسانياً
- (c) المسافة بين حافة اللثة الحرة و قاع الفم الوظيفي 7 مم
- (d) المسافة بين حافة اللثة الحرة و قاع الفم الوظيفي 8 مم

20- تعليمات ارتداء جهاز سني جديد

- (a) في الفترة الأولى، يجب تجنب الأطعمة القاسية واللصاقة
- (b) تعطى مكتوبة دون الحاجة لقراءتها
- (c) تمتد مدة التكيف 1-2 أسبوع
- (d) ينزع الجهاز ليلاً منذ البداية